

Probabilités et Statistiques

Année 2010/2011

laurent.carraro@telecom-st-etienne.fr olivier.roustant@emse.fr



Objectifs

- > Acquérir les concepts élémentaires de probabilités.
- Préparer aux enseignements qui suivent (ex : processus aléatoires).
- > Comprendre ce qu'est la modélisation probabiliste.
- > Acquérir un savoir-faire probabiliste en relation avec des applications.
- Acquérir un savoir-faire statistique et savoir aborder un problème simple de traitement de données.
- > Savoir traiter un problème simple de régression.



Choix pédagogiques

- > Ne pas traiter les fondements des probabilités (théorie de la mesure)
 - 120h en master 1 de maths ...
 - Théorie utile seulement pour une minorité (0 à 5)
- Un enseignement différent de celui que vous avez connu
 - Moins de démonstrations, plus d'applications
 - Apprentissage de savoir-faire
- > Apprentissage Par Problèmes (APP)



Moyens pédagogiques

> Modalités :

- Cours: 14 séances (21h)
- TD: 13 séances (19,5)
- TP: 3 séances (4,5h)
- APP: 2 séances (3h)

> Outils logiciels :

- Excel (utilisé en entreprise)
- R (logiciel libre dédié aux statistiques, utilisable en entreprise)

> Portail

> + forum: http://www.telecom-st-etienne.fr/forum/



Evaluation

- > QCM
- > Compte rendus ou soutenances (TP et APP)
- > Examen

> Pondérations :

QCM: 15%

2 TP et 1 APP : 10% chacun soit 30%

Examen: 55%



Plan du cours

- Le modèle probabiliste. Probabilité conditionnelle. Indépendance.
- Variable aléatoire. Loi. Fonction de répartition. Densité.
- Espérance. Variance. Covariance.
- Outils d'exploration de données : histogramme, boxplot, applot...
- Loi des grands nombres, simulation et méthode de Monte Carlo.
- Théorème de la limite centrée (TLC).
- Vecteurs aléatoires, loi, indépendance. Vecteurs gaussiens.
- Estimation: biais, risque, méthodes d'estimation (MC, EMV)
- Intervalles de confignce
- Tests statistiques. Vocabulaire. Méthodologie. Notion de pvaleur
- Régression linéaire: modèle probabiliste, estimation, analyse de variance, validation, prédiction



Cours °1


Vers la définition d'une probabilité



Exemple 1

Test de résistance d'un isolant de bougie par claquage à partir d'un échantillon de taille 60

Données des rigidités diélectriques



Rigidité diélectrique (V/cm)

R : rigidité diélectrique

P(R < 11) ?


P(R < 11.5)?



1^{er} calcul, définition fréquentiste

 $P(R < x) = \# \{ valeurs \ observées < x \} / \# \{ valeurs \ totales \} \}$

Fonction de répartition empirique



On obtient:

$$P(R < 11) = 1/60 \approx 1.66\%$$

$$P(R < 11.5) = 3/60 = 5\%$$

Remarques:


$$P(R < 10) = 1/60 \dots$$



2^{ème} calcul, avec une « loi de probabilité »

Loi de Weibull : $P(R < x) = 1 - \exp(-(x/\lambda)^{\alpha})$

Ajustement d'une loi de Weibull (zoom)



On obtient:

$$P(R < 11) \approx 2.06 \%$$


$$P(R < 11.5) \approx 3.56 \%$$

Remarque:

$$P(R < 9.5) \approx 0.33\%$$




Exemple 2






Influence d'autres variables?




teleconRelation température/consommation





Paradoxe de J. Bertrand



Soit un disque de rayon R.


On tire une corde au hasard.

Quelle est la probabilité que la corde soit plus longue que le côté du triangle équilatéral inscrit ?

Probas-Stats FI1



Réponse




On choisit le milieu de la corde au hasard dans le disque

$$p = 1/4$$

Probas-Stats FI1



Deuxième réponse :-)




On fait tourner la figure et on choisit le milieu de la corde sur le segment [0,R]

$$p = 1/2$$

Probas-Stats FI1



Troisième réponse :-(



On fixe un point sur le cercle, et on choisit l'autre au hasard

$$p = 1/3$$




Quelle solution?

- > Réponse : préciser les hypothèses
 - Cas n°1: simuler uniformément un point dans le disque
 - Cas n°2 : simuler uniformément l'angle et le rayon
 - Cas n°3: simuler uniformément 1 point sur le cercle

Illustration:


 $cas n^{\circ}1 \neq cas n^{\circ}2$





La vision mesure (d'aire)

- Considérons une erreur de mesure ε sur Ω =D(0,1) de R²
- On donne A ⊂ Ω. Comment calculer la probabilité que ε soit dans A ?



- Morale du paradoxe de Bertrand: préciser les hypothèses!
- Question : par analogie, si nous devions calculer la masse de A, de quoi aurions-nous besoin ?



La densité

- Réponse : de la densité de masse du disque
- Par exemple, $f(x,y) = \exp(-r^2)$, avec $r^2 = x^2 + y^2$, pour $0 \le r \le 1$
- Questions:
 - Comment s'interprète cette densité ?
 - Comment l'utilise-t-on pour calculer la masse ?



La probabilité

- Raisonnons maintenant en probabilité
- Hypothèse : on se donne la densité de probabilité
- f(x,y) proportionnel à exp(-r²), avec r²=x²+y², pour 0≤r≤1
- Questions :
 - Comment trouver la constante de proportionnalité ?
 - Comment s'écrit la probabilité cherchée ?
 - Avec la vision mesure, quelles sont les propriétés minimales que l'on est en droit d'exiger d'une probabilité?

telecom Définition provisoire d'une probabilité

- Définition (incomplète) d'une mesure On se donne un ensemble Ω , support des valeurs possibles. Une mesure μ est une application sur $\wp(\Omega)$ vérifiant :
 - $\mu(\varnothing)=0$
 - $\mu(\Omega) < +\infty$
 - Pour toute séquence d'éléments de $\wp(\Omega)$, A_1 , ..., A_n , alors si les A_k sont deux à deux disjoints,

$$\mu(A_1 \cup ... \cup A_n) = \mu(A_1) + ... + \mu(A_n)$$
 (additivité)

Question : Que faut-il rajouter pour obtenir une probabilité ?



Modèle probabiliste

- Modèle probabiliste
 - La définition d'une probabilité dépend donc de Ω.
 - Lorsque μ est une probabilité sur $\wp(\Omega)$, le triplet $(\Omega, \wp(\Omega), \mu)$ définit un modèle probabiliste
- Questions:
 - Quels modèles probabilistes connaissez-vous ?
 - Les probabilités correspondantes sont-elles des mesures ?
 - Sont-elles toujours définies à partir d'une densité ?



La reine des probabilités

- La densité de probabilité précédente est voisine de celle de la loi normale standard (ou loi de LAPLACE-GAUSS)
- En dimension 1, son expression est donnée par :

$$f(x) = 1/\sqrt{(2\pi)} * \exp(-x^2/2)$$

C'est la fameuse « courbe en cloche »

• Elle est très souvent utilisée pour modéliser des erreurs, à cause d'un résultat théorique fondamental :

le Théorème de la Limite Centrée